

BOZZA BOLLETTINO SPECIALE FLAVESCENZA DORATA (*Scaphoideus titanus*)

Lotta obbligatoria alla cicalina *Scaphoideus titanus* vettore della flavescenza dorata della vite

Per il contenimento di questa pericolosa malattia da quarantena risulta fondamentale il **controllo dell'insetto vettore** tramite difesa insetticida e **l'eliminazione tempestiva delle viti con sintomi di giallumi** (<https://fitoemergente.fmach.it/flavescenza-dorata>).

Il 28 maggio 2024 il Dirigente del Servizio Agricoltura della provincia di Trento con la determinazione n. 5516 ha emanato le direttive per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite: **si conferma l'obbligatorietà dell'esecuzione di due trattamenti insetticidi**, come da indicazione del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach, contro l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* **su tutto il territorio vitato provinciale**.

PRIMO INTERVENTO INSETTICIDA

Eeguire il primo intervento insetticida obbligatorio a fioritura della vite conclusa (date consigliate):

- dal **12 al 18** giugno nelle zone di fondovalle e bassa collina
- dal **18 al 24** giugno media collina
- dal **24** giugno e comunque a fioritura conclusa nell'alta collina

con **UNO** dei seguenti prodotti fitosanitari:

- **Acetamiprid (Epik a 1,5 litri/ettaro o Kestrel a 0,45 litri/ettaro:** prodotti non utilizzabili nelle fasce di rispetto in prossimità di aree specifiche e luoghi sensibili).
- **Flupyradifurone (Sivanto Prime o Riamba a 0,5 litri/ettaro:** prodotti non utilizzabili nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque per il consumo umano e nelle fasce di rispetto in prossimità di aree specifiche e luoghi sensibili).
- **Piretro a dosaggi vari di etichetta** (utilizzabile anche nei vigneti coltivati con metodo biologico e in conversione, alcuni prodotti - es. Pirecris, Tersus con frase di rischio H317 - non sono utilizzabili nelle fasce di rispetto in prossimità di aree specifiche e luoghi sensibili).

SECONDO INTERVENTO INSETTICIDA

Eeguire il secondo intervento insetticida obbligatorio con uno dei seguenti prodotti fitosanitari:

- **Etofenprox (Trebon up, Sword up) a 0,5 lt/ha** a distanza di **circa 10 giorni dal primo intervento** (nelle aziende a conduzione integrata).
- **Piretro** (solo nei vigneti coltivati con metodo biologico e in conversione): dosaggi vari di etichetta a distanza di **circa 7 giorni dal primo intervento**, alcuni prodotti (es. Pirecris, Tersus con frase di rischio H317) non sono utilizzabili nelle fasce di rispetto in prossimità di aree specifiche e luoghi sensibili.

Indicazioni:

- La fioritura della vite deve essere conclusa prima dell'intervento insetticida, **è vietato trattare con insetticidi durante il periodo di fioritura della specie trattata (L.P. 11 marzo 2008).**
- **Eeguire lo sfalcio del cotico erboso nell'interfila e nel sottofila del vigneto** prima del trattamento insetticida per una maggior salvaguardia dei pronubi e per raggiungere meglio con la miscela fitosanitaria i fusti delle viti e gli eventuali polloni.
- **Per la salvaguardia dei pronubi eseguire i trattamenti insetticidi nelle ore serali o comunque entro le prime ore del mattino.**
- **Prima del trattamento con Etofenprox ripetere lo sfalcio del cotico erboso se sono ricomparse essenze in fioritura.**
- È importante bagnare bene tutta la vegetazione della vite, fusto compreso, con volumi di acqua adeguati aprendo anche gli ugelli più bassi della raggiera.
- Nelle pergole doppie è preferibile trattare "ala per ala" per migliorare la qualità della distribuzione.
- Prima del trattamento è opportuno terminare le operazioni di spollonatura.
- Nel caso dell'utilizzo del **piretro**, è opportuno eseguire il trattamento **nei primi giorni delle diverse finestre d'intervento consigliate**, trattare nelle **ore serali** e **acidificare** la miscela fitosanitaria.
- Evitare di miscelare Flupyradifurone con Dithianon per possibili danni da fitotossicità.
- **Rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta** del prodotto fitosanitario.